

Stenchaetothrips biformis (Bagnall) イネアザミウマ

[形態] 体長♀約1.4 mm、♂約1.2mm。♀♂ともに長翅型 [a & b]。体は暗褐色。腿節及び脛節は褐色、跗節は黄色；触角第3-5節基部1/2は黄色 [d]；前翅は褐色 [f]。頭部は幅とほぼ同じ長さで前方にやや突出し、頬はほぼ直線的 [c]；単眼間刺毛は後方単眼の前方から生じる；複眼後方のS1刺毛をしばしば欠き、S3刺毛は最長。触角は7節で第6は最長。前胸背板は大部分平滑で、約20本の背板上刺毛と3対の後縁刺毛を持つ。中胸背板の前方に鐘状感覚器を欠く。後胸背板は間隔の狭い縦条刻線を備え、鐘状感覚器を欠く [e]。中胸腹板又状器は小棘を欠くか痕跡的 [g]。腹部背板の後縁は外側を向いた小さな歯状突起を持つ；第9背板の鐘状感覚器は1対 [h]。腹板は副刺毛を欠く。♂腹部背板後縁の外

側を向く歯状突起は♀よりも大きく、第8背板後縁には中央部へ向かう突起を持つ [i]；腹板は微刺を持ち、腹板の腺域は横長 [j]。

[分布] 日本全国；ほぼ汎世界。

[生態] 様々なイネ科に見られる。

[Diagnosis] Body brown; fore wing dark. Mesonotum with CPS anteromedially; metascutal sculpture closely spaced, CPS absent; mesosternal spinula absent. Abdominal tergite IX with 1 pair of CPS; sternites without discal setae. Male sternites with microtrichia; sternites III-VII with sternal pore plates transverse.